

Вакцинопрофилактика не защищает и никогда не защищала людей от инфекций!



Это утверждение не имеет ничего общего с действительностью. В истории вакцинопрофилактики существует множество примеров возникновения целых эпидемий инфекционных заболеваний в результате массового отказа от прививания:

Стокгольм – 1873 – 1874гг. – натуральная оспа; Великобритания – 1970-1980гг. – коклюш; Россия – 1986-2000гг. – краснуха. И таких примеров еще огромное множество и в каждом случае был зафиксирован спад заболеваемости при увеличении охвата вакцинацией.

В вакцинах содержится огромное количество токсичных веществ, таких как фенол!

Фенол – используется как часть растворителя для туберкулина, которые используют для постановки реакции Манту. *В данном препарате содержится около 250мкг фенола.* При этом фенол образуется как метаболит в самом организме и выделяется вместе с мочой. За сутки человек выделяет около 160 мг эндогенного фенола, что даже не идет ни в какое сравнение с 250мг, вводимыми для реакции Манту.

О вреде вакцин заявляют авторитетные ученые и эксперты!

В основной своей массе **против вакцинации** выступают врачи, которые никогда не занимались вакцинопрофилактикой и не видели общей картины и статистики от пользы вакцинации.

Также против прививок выступают «не врачи» - химики, физики, биологи, а также журналисты и публицисты, которые неправильно интерпретируют результаты исследований и ловко «жонглируют» фактами.



ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ"

ПРАВДА И МИФЫ О ВАКЦИНАЦИИ



В вакцины против гриппа добавляют СКВАЛЕН!



Сквален обычно используют в составе противогриппозных вакцин в странах Европы.

Сам сквален, даже если может отпугнуть своим названием, ничего токсичного и опасного из себя не представляет,

так как он является предшественником всех стероидов и гормонов человека и постоянно циркулирует в крови.

АКДС и АДС вакцины вызывают аутизм!

Самое частое заблуждение, муссируемое в среде противников вакцинации, связано с одним веществом, содержащим ртуть – **тиомерсал** (*Этилртутьтиосалицилат натрия*)

Тиомерсал – является антисептическим средством, которое помимо вакцин применяется в ушных и глазных каплях. Тем не менее «антивакцинаторы» выдвинули теорию о том, что именно это вещество вызывает расстройства аутистического типа. Данная теория до сих пор не доказана ни клинически, ни экспериментально.

Вакцину БЦЖ отменили во всех цивилизованных странах!

Не правда, БЦЖ применяют во всех странах без исключения из-за довольно высокой заболеваемости туберкулезом, просто везде она применяется по-разному. В большей части стран это всеобщая неонатальная вакцинация, в неко-

торых странах она используется с ревакцинацией, а в некоторых странах это избирательная вакцинация людей из групп риска.

Согласно ВОЗ: «БЦЖ, единственная существующая в настоящее время вакцина против туберкулеза, обеспечивает защиту от туберкулезного менингита и диссеминированной формы у младенцев и детей младшего возраста. За прошедшие годы вакцинация БЦЖ позволила спасти тысячи человеческих жизней. Эта вакцина относительно безопасна, недорогая и требует лишь одной инъекции. Несмотря на недостатки, вакцинация БЦЖ в большинстве эндемичных стран рассматривается в качестве жизненно необходимого и важного элемента стандартных мер по борьбе с туберкулезом»

БЦЖ не защищает от туберкулеза!

С 1977 по 2006 гг. в авторитетных медицинских научных журналах были опубликованы результаты более 35 конкретных клинических испытаний, выполненных в различных по частоте заболеваемости странах: в Канаде и Греции, Турции и Финляндии,



Индии и Боснии и других с позитивной оценкой защитной эффективности и экономической выгоды вакцинации БЦЖ. Согласно этой оценке, БЦЖ-вакцинация препятствует инфицированию и возникновению первичного туберкулеза, облегчает течение вторичного, продлевает жизнь и повышает эффективность других вакцинаций.

Вакцинация вызывает опасные анафилактические реакции!

Это утверждение основано на чрезмерном преувеличении действительности. На практике анафилактические реакции крайне редко встречаются. По данным более двух десятков независимых исследований с современными вакцинами анафилаксия встречается в диапазоне от 1/5000000 до 1/30000.



Я не могу прививаться по религиозным соображениям!

Ни одна из современных религиозных конфессий не одобряет отказ от прививок. **Патриарх Алексий II еще в 2004 году благословил иммунопрофилактические мероприятия в Санкт-Петербурге.**

В вакцинах содержатся возбудители неизлечимых заболеваний: рака и СПИДа!

Этиология онкологических заболеваний изучается до сих пор и подтверждения теории об их вирусном происхождении не получено. Вакцина против ВИЧ находится еще в стадии разработок. По этой причине в вакцинах не может содержаться вирус иммунодефицита человека.